

LINEE GUIDA PER L' IDONEITA' DEI DONATORI

Il Centro Trasfusionale di Fabriano ha comunicato le nuove linee guida per l'idoneità alla donazione del sangue e degli emocomponenti, elaborate dal *Dipartimento Regionale di Medicina Trasfusionale* in base ai nuovi decreti del 03/03/2005.

Si riassumono nelle tabelle successive i **più frequenti motivi di sospensione** per situazioni patologiche con il riferimento alla **durata della sospensione**, trascorsa la quale il donatore ritorna idoneo alla donazione.

Per qualunque problema non trattato o non chiarito, il donatore/trice è pregato di contattare direttamente un medico del Centro Trasfusionale dalle ore 7,30 alle ore 13,30 di tutti i giorni feriali ai seguenti numeri: 0732 707281/370.

Durata sospensione	Motivo
UN ANNO	- dopo il parto
SEI MESI	- Toxoplasmosi - Mononucleosi - Herpes Zoster (il tempo si conta dalla avvenuta guarigione)
QUATTRO MESI	- Intervento chirurgico (normale, laparoscopia e/o endoscopia) - indagini endoscopiche: gastroscopia, colonscopia, rettoscopia, cistoscopia, isteroscopia, artroscopia - trasfusioni di sangue e derivati - foratura orecchie, tatuaggi, piercing - interruzione di gravidanza - rapporti sessuali con soggetti a rischio di trasmissione di malattie infettive.
TRE MESI	- viaggi in paesi tropicali - punture di zecca
UN MESE	- dopo la guarigione di malattie infettive - dopo cure odontoiatriche di qualsiasi tipo - vaccinazioni : morbillo, parotite, febbre gialla, poliomielite, rosolia, TBC
QUINDICI GIORNI	- dopo guarigione dall' influenza
UNA SETTIMANA	- dopo guarigione dal raffreddore
48 ore	- vaccinazioni : tetano, peste, tifo, paratifo, influenza, pertosse, difterite, colera, rabbia, virus epatite "A" e "B"

USO DI FARMACI

Tipicamente un farmaco si prende per curare una malattia: in questi casi, la sospensione è determinata dalla malattia stessa (vedi tabella precedente). In altre situazioni, è prevista una sospensione come segue:

Durata sospensione	Motivo
DUE SETTIMANE	- assunzione di antibiotici e cortisonici
CINQUE GIORNI	- assunzione di aspirina o farmaci equivalenti
MATTINA DONAZIONE	- terapia antiipertensiva (si consiglia di sospendere la assunzione del farmaco solo per effettuare la donazione)

Nessuna sospensione è prevista in caso di assunzione di pillole anticoncezionali.